

Nr. 2070 10 Jahre männl.

**KL II/2, Kreuzbiss,
Gesichtsasymmetrie, Platzmangel,
ausgeblockter Zahn 22**

Ausgangssituation
2004-03

Diagnose:

- asym. Kl.II/2 (rechts 2mm, links 4mm)
- Kreuzbiss 21,63,64,65 und
Gesichtsasymmetrie
- starker OK-Raummangel
- Spitzbogen und palatinal einen
ausgeblockten Zahn 22



Behandlungsplan:

- Vorerst mit EOA den Fehlbiss soweit als möglich vorbehandeln.
- Den Rest dann mit festsitzender KFO nach Prof. Sato.

Therapeutischer Konstruktionsbiss und EOA (Elastisch offener Aktivator)



2004-03 bis 2007-08



MEAW-Technik nach Prof. Sato

Brackets-Zeit: 7 Monate



Fernröntgen




2004-03
Before FKO



2007-08
After FKO, before KFO



2009-02
After KFO
und Entfernung der
Weisheitskeime



2004-03
Before FKO



2007-08
After FKO, before KFO



2008-05
After KFO

2004-03
Before FKO



2007-08
After FKO, before KFO



2008-05
After KFO



2004-03
Before FKO



2007-08
After FKO, before KFO



2008-05
After KFO



2004-03 Before FKO



2007-08 After FKO, before KFO



2008-05 After KFO



2004-03

Before FKO



2007-08

After FKO, before KFO



2008-05

After KFO



2004-03 Before FKO



2007-08 After FKO, before KFO



2008-05 After KFO



Retention:

Um das Ergebnis zu halten, trägt der Patient nachts im Oberkiefer einen Sato-Retainer



Fixer Retainer (dünner Draht von Eckzahn zu Eckzahn) im Unterkiefer